

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

SON INFECCIONES TRANSMITIDAS DE UNA PERSONA A OTRA POR EL CONTACTO SEXUAL

- Gonorrea
- VIH/SIDA
- Virus Papiloma Humano
- Vaginosis Bacteriana
- Sífilis



- Herpes Genital
- Tricomoniasis
- Clamidia
- Hepatitis B



GONORREA

Se transmite al tener relaciones sexuales anales , vaginales y orales con una persona que tenga esta enfermedad. Es causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae* y puede propagar cualquier tipo de actividad sexual.

Los signos de síntomas de infección de gonorrea en las mujeres incluye:

- Aumento de flujo vaginal
- Dolor de orina
- Sangrado vaginal entre periodos , como después de una relación sexual
- Dolor abdominal o pélvico

VIH/SIDA

Se contrae a través de las relaciones sexuales anales o vaginales, o al compartir agujas , jeringas u otros implementos para la inyección de drogas.

Signos y síntomas del VIH:

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular y articular
- Erupción
- Dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca
- Ganglios linfáticos inflamados , principalmente en el cuello
- Diarrea
- Perdida de peso
- Tos
- Sudores nocturnos
- Fatiga

PAPILOMA HUMANO

Se contrae al tener relaciones sexuales orales , vaginales o anales con una persona que tenga el virus. El virus puede transmitirse incluso cuando la persona no presenta signos ni síntomas.

Síntomas

-Verrugas genitales:

Pequeños bultos en forma de coliflor o pequeñas protuberancias en forma de tallo.

En las mujeres , las verrugas genitales aparecen principalmente en la vulva , pero también cerca del ano , en el cuello del útero o en la vagina.

En los hombres , las verrugas genitales aparecen en el pene y el escroto alrededor del ano. Rara vez causan molestias o dolor , aunque pueden causar comezón o tener sensibilidad.

-Verrugas comunes:

Las verrugas comunes aparecen como bultos ásperos y elevados y generalmente se presentan en las manos y en los dedos. En la mayoría de los casos , las verrugas comunes son simplemente antiestéticas , pero también pueden ser dolorosas o susceptibles a las lesiones o sangrado.

-Verrugas plantares:

Son bultos duros y granulados que generalmente aparecen en los talones o en la parte delantera de las plantas de los pies y pueden causar molestias.

-Verrugas planas:

Son lesiones planas y ligeramente elevadas. Pueden aparecer en cualquier parte , pero los niños suelen tenerlas en el área de la barba. Las mujeres tienden a tenerlas en las piernas.

VAGINOSIS BACTERIANA

La infección ocurre comúnmente en las mujeres sexualmente activas.

Síntomas

- Secreción vaginal delgada , gris , blanca o verde
- Comezón vaginal
- Olor vaginal fétido a “pescado”
- Ardor al orinar

SÍFILIS

Se puede contraer a través del contacto sexual directo con una úlcera infecciosa existente en los genitales , el ano , el recto , los labios o la boca, anales u orales sin protección con una persona que tenga sífilis. También a través del contacto directo con una lesión activa , como al darse un beso.

Síntomas

Se desarrolla por etapas, y los síntomas varían con cada etapa.

-Sífilis primaria:

Pequeña llaga , llamada Chancro. La llaga aparece en el lugar por donde la bacteria entro a su cuerpo. Esta se presenta alrededor de tres semanas.

-Sífilis secundaria:

Después de recuperación del chancro original , se puede experimentar una erupción que comienza en el tronco , pero que acaba cubriendo todo el cuerpo.

-Sífilis terciaria:

La enfermedad puede dañar el cerebro , los nervios , los ojos , el corazón , los vasos sanguíneos , el hígado , los huesos y las articulaciones.

- Sífilis lenta:

Si no recibes tratamiento para la sífilis , la enfermedad pasa de la etapa secundaria a la etapa oculta (lenta), durante la cual no se tendrá síntomas.

-Sífilis congénita:

La mayoría de los recién nacidos con sífilis congénita no presentan síntomas , aunque algunos experimentan una erupción en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Pueden incluir sordera , deformaciones dentales y nariz en silla de montar , donde colapsa el tabique nasal.

HERPES GENITAL

Se puede contraer al tener relaciones sexuales vaginales , anales u orales con alguien que tenga esta enfermedad.

Los signos comienzan entre los 2 y 12 días después de la exposición al virus.

Síntomas

- Dolor o picazón alrededor de los genitales
- Pequeños bultos o ampollas alrededor de los genitales , el ano o en la boca.
- Úlceras dolorosas que se forman cuando las ampollas se rompen y exudan o sangran.
- Costras que se forman a medida que las úlceras se curan.
- Micción dolorosa.
- Secreción de la uretra , el conducto que expulsa la orina del cuerpo.
- Fiebre.
- Dolor de cabeza.
- Hinchazón de los ganglios linfáticos de la ingle.

TRICOMONIASIS

Se puede contraer a través de las relaciones sexuales vaginales sin protección con una persona que tenga esa enfermedad.

Síntomas en las mujeres

- Secreción vaginal delgada y , a menudo, con olor desagradable , que puede ser de color transparente , blanco , gris , amarillo o verde.
- Enrojecimiento , ardor y picazón en los genitales.
- Dolor al orinar o al tener relaciones sexuales.
- Molestia en la parte inferior del estómago.

Síntomas en los hombres

- Picazón o irritación dentro del pene.
- Sensación de ardor al orinar o luego de eyacular.
- Secreción proveniente del pene.

CLAMIDIA

Se transmite al tener relaciones sexuales vaginales , anales u orales sin protección con una persona con infección por *C.trachomatis* , o bien de madre a hijo durante el parto.

Síntomas

- Micción dolorosa.
- Flujo vaginal en mujeres.
- Secreción del pene en hombre.
- Dolor durante las relaciones sexuales en mujeres.
- Sangrado entre periodos menstruales y después del sexo en mujeres.
- Dolor testicular en los hombres.

HEPATITIS B

Se contagia mediante el contacto directo con fluidos corporales infectados, generalmente a través de un pinchazo de aguja o por contacto sexual.

Síntomas

- Cansancio y debilidad inusuales.
- Náuseas , vómitos y diarrea repentinos.
- Dolor o molestias abdominales , especialmente en la parte de superior derecha debajo de las costillas inferiores , que esta por encima del hígado.
- Heces e color arcilla o gris.
- Pérdida de apetito.
- Fiebre baja.
- Orina oscura.
- Color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos.
- Picazón intensa.